

**Auteur :** MARCHAND GONOD (NICOLE)

**Titre (fr.) :** INCIDENCE DE LA DEPRESSION CHEZ LES HOMOSEXUELS MASCULINS HOSPITALISES POUR INFECTIONS AU VIH.

**Titre (ang.) :** INCIDENCE OF DEPRESSION AMONG HOMOSEXUAL MEN HOSPITALIZED WITH CLINICAL AIDS.

**Directeur :** [WIDLOCHER \(DANIEL\)](#)

**Discipline :** PSYCHOLOGIE : PSYCHO-PATHOLOGIE, PSYCHOLOGIE : PSYCHO-SOCIOLOGIE. ETHNO-PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE : PSYCHO-GENERALE. ETHOLOGIE HUMAINE

**Mots-clés :** /DEPRESSION/HOMOSEXUALITE/SIDA/PERTE AFFECTIVE/ALCOOLISME MASCULIN

**Année :** 1993

**Université :** PARIS 5

**Reproduction :** THESE MICROFICHEE

**N° identification :** 93PA05H025

**Résumé (fr.) :** METHODE : ECHELLES D'EVALUATION DE LA DEPRESSION : - HDRS (HAMILTON, 1974) ; - RALENTISSEMENT DEPRESSIF (WIDLOCHER & COLL. 1983) ; - QUESTIONNAIRE SEMI-DIRECTIF PORTANT SUR L'ANAMNESE DES PATIENTS HOSPITALISES, CHOISIS "AU HASARD". RESULTATS : D'APRES NOTRE ETUDE, IL APPARAIT QUE : 1) LE RISQUE DEPRESSIF DIMINUE : - QUAND L'HOMOSEXUALITE EST CONNUE ET ACCEPTEE PAR LA FAMILLE AVANT LA SEROPOSITIVITE ; - QUAND LE PATIENT A FAIT LUI-MEME UNE DEMANDE DE SEROLOGIE ; - QUAND IL A UN PARTENAIRE AFFECTIF STABLE ET QUAND IL EST INVESTI DANS DES ACTIVITES VALORISANTES (PROFESSIONNELLES, SOCIALES OU AUTRES). 2) LE RISQUE AUGMENTE : - QUAND IL EXISTE DES PERTES AFFECTIVES RECENTES (DEUILS OU ABANDONS DE TOUTES SORTES) ; - QUAND LES INFECTIONS SE MULTIPLIENT AINSI QUE LES HOSPITALISATIONS : DUREE DE LA MALADIE D'AUTANT QUE LA DETERIORATION PHYSIQUE QUI LUI EST LIEE. CONCLUSION : SUR 30 PATIENTS : - 9 (30 %) NE SONT PAS DEPRIMES AU MOMENT DE L'ENTRETIEN ; - 21 (70 %) SOUFFRENT DE DEPRESSION.

**Résumé (ang.) :** METHODS : RATING SCALES TO EVALUATE DEPRESSIVE SYMPTOMS : - HDRS (HAMILTON, 1974) ; "RALENTISSEMENT DEPRESSIF" (WIDLOCHER & ALL. 1983) - A SEMI-DIRECTIVE INTERVIEW ABOUT THE HISTORY OF THESE IN-PATIENTS WHO WERE CHOSEN AT RANDOM. RESULTS : ACCORDING TO OUR STUDY, IT SEEMS THAT : 1) DEPRESSIVE TENDENCIES ARE REDUCED : - WHEN HOMOSEXUALITY IS KNOWN AND ACCEPTED BY FAMILY BEFORE INFECTION ; - WHEN THE PATIENT HAS REQUESTED HIMSELF THE HIV SEROLOGY ; - WHEREVER HE LIVES WITH HIS SEXUAL PARTNER OR INVOLVES HIMSELF IN A GRATIFYING ACTIVITY (IE. PROFESSIONAL, SOCIAL OU ELSE). 2) RISKS ARE RISING : - WHEN RECENT AFFECTIVE LOSSES OCCUR (DEATH OR REJECTIONS OF ALL SORT) ; - BY AN ACCELERATED EVOLUTION OF THE OPPORTUNISTIC INFECTIONS AGENTS, INCREASING THE RATE OF HOSPITALISATIONS ; ITS DURATION AS WELL AS PHYSICAL DETERIORATION. CONCLUSION : AMONG THESE 30 IN-PATIENTS : - 9 (30 %) WERE NOT DEPRESSED AT THE TIME OF THE RESEARCH - 21 (70 %) WERE SHOWING A DEPRESSIVE CONDITION.